

用意することができる。

質問：川西 弘（金沢大・放射線科）

肝シンチグラム可能な注射量で肝 uptake を試みられる理由（肝シンチグラムでも診断可能な症例が多いようだが）。

答弁：徳山輝男（千大・放射線科）

肝面スキャンニングの特徴から肝疾患の診断を行なう試みは、われわれも行なっているが、肝の形態上の特徴だけでは不十分であると考え、摂取率の面から、量的に検討して、初めて肝の描記、脾の描記の程度をはっきりさせることができる。

面スキャンニングはあくまで形態の読影であり、摂取率はそれを量的にとらえるものであって、とくに肝と脾の出方の比較、肝の描記の悪さなどは、量的にとらえることなしには論ずることはできない。

われわれの目的は、肝疾患の診断だけでなく、病変の程度を含めて、量的にとらえることである。

質問：久田欣一（金沢大・放射線科）

肝 RI 摂取率を測るのに肝シンチグラムを前もって測るのでは、すでに肝シンチグラムのみで診断がついてしまうのが多く、摂取率は必要でないのではないか。たとえば肝硬変でも、肝シンチグラムだけで大体診断つくのではないか。

われわれが演題53において報告することく。

答弁：徳山輝男（千大・放射線科）

正しくは、肝スキャンニングを行なって、隣接臓器の位置を確めなければ、B フィルターはかけられないが、症例を重ねると、脾の位置はおおよそ推定できる。

このさいの μ 数は10~50 μ cで十分行なうことができる。必要な場合には、摂取率測定後、面スキャンニングを行なってB フィルターの位置と、脾の位置を確めている。

また面スキャンニングは100 μ c程度で行なっているがその後2~3日後に摂取率を測定し、differential 計測法なので、計測は十分正しく行なえる。

質問：木谷健一（東大・上田内科）

1. 1回投与量100 μ cといわれるが、投与重量はどのくらいを用いたか。

2. 肝摂取率は、投与量が一定量をこえれば、飽和による影響が無視できないと思われるゆえ、このような検討に注意が必要ではないか。

答弁：徳山輝男（千大・放射線科）

使用した RI はイギリス、Amersham 製で、到着後1週間以内に使用している。放射能の μ c数を揃えている

ので、使用日によって Au コロイドの量は違っている。

Au コロイドの量を揃えることは理想であるが、実際には困難である。臨床例の測定で実際支障がないので、1週以内の使用でさしつかえないものと思う。

48. ラジオアイソトープによる 肝疾患時の肝循環について

中川昌壮，小川智之

＜小坂内科＞

草井 寛，穂山隆夫

＜アイソトープ診療室＞（岡山大学）

岡大小坂内科入院の肝疾患患者120名に RI 標識物質による肝循環動態の測定を行ない、 ^{198}Au コロイド単独または RISA 併用の141例の成績について発表した。

肝臓集積曲線より算出したクリアランス k_L は平均値で正常例13例 0.148 ± 0.020 に對し、肝硬変40例は 0.097 ，慢性肝炎54例 0.130 であった。腹腔鏡診断ならびに組織診断別にみると、この傾向はより明らかであり、 k_L が 0.09 以下の症例は全例肝硬変であった。異常高値例は組織診断で星細胞反応の強い活動型肝炎に多いことが注目された。肝静脈カテーテル法による有効肝血流量とは正、肝静脈 wedge 圧とは負の相関を認めた。BSP 試験30分値が5%以下の正常例では k_L も正常、25%以上の高度障害例では急性肝炎例を除き k_L 低下、5~25%の度ないし中等度障害例では k_L 正常群と低下群とに分かれ諸種の検査成績は正常群の方がよいが、組織学的に活動型肝炎例が高率に認められ、予後判定上重要である。

J.L. Westover らに倣って、RISA 併用により全血流量の測定と併せて肝細胞機能を表現するQ値を測定した。疾患別の値のQ平均値は正常例10例 $20.6 \pm 3.4\%$ ，急性肝炎（回復期）3例 24.8% ，慢性肝炎23例 20.3% ，肝硬変17例 16.6% ，輸血後肝炎9例 18.0% であった。 k_L とQ値とはかなり明らかな正の相関を示した。全血流量と k_L より求める肝血流量は、同一時期に肝静脈カテーテル法を施行した12症例の有効肝血流量よりかなり低値を示した。この RISA- ^{198}Au 法にて求めた肝血流量 (cc/min/M^2) の平均値を疾患別にみると、正常例9例 347.5 ± 33.4 ，慢性肝炎15例 288.8 ，肝硬変14例 215.4 ，輸血後肝炎5例 327.3 であり、他の方法による諸家の報告に比しかなり低値を示したのは Au コロイドの肝除去率の点と RISA による全血流量測定結果のばらつきとに原因があらと考えられる。