

に上昇した6例の頭部血流量の平均値は810cc/分で、著明に減少したが、これは血液粘度度の上昇が、血流障害をきたす一因とも考えられる。眼底変化とは有意な差は認められなかった。

*

16. カテーテル経路選択的 RI 注入による Temporal Scanning

本保善一郎 玉木正男 深谷徳幸 常岡 彰
天本裕平 犬塚三雄 計屋慧実
(長崎大放射線科)

〔目的〕 全身各所の動脈へのカテーテル送込が seldinger 法で可能となったので、注射針の到達しえない臓器動脈から選択的に RI を注入することによってほかの部分からの back-ground をなるべく除外した条件下でその臓器についての radiocirculography などの temporal scanning を試みる。

〔方法〕 装置としては、時間的に変化の速い現象も十分捕えることができるよう time-constant の短い間歇積分計(日本無線CR-3型)、電磁オシログラフ(横河EMO-62型、応答性2msec)、シンチレーションデテクター(分解能6 μ sec)を使用した。使用 RI: 放射性ヒップラン、放射性ヨードナトリウム。成犬の腹部大動脈(腎動脈より数cm上方)、大動脈洞、一側腎動脈および総頸動脈にカテーテル経路により放射性ヒップランまたは放射性ヨードナトリウムを用手注入、それぞれ腎、心、頭部で temporal scanning を行なう。注入量: 50~500 μ c を生食水で5~20cc に希釈、また一側腎動脈の人工的狭窄例および結紮例についても試みた。

〔結果〕 選択的に注入されたうすめられない RI の流動を間歇積分計で記録すると血流動態を忠実に把握することができる。選択的腎動脈注入では RI 静注による renogram と異なった曲線がえられた。また大動脈洞部に RI を選択的に注入し、下行大動脈をさけてデテクターを心臓にあてて冠状循環の radiocirculography を実施、まず Na¹³¹I で試行、近々 ^{99m}Tc で行なう予定。

*

17. 「寒天法」による ³²P- β 線療法の治療成績

深谷徳幸 犬塚三雄 計屋慧実
(長崎大放射線科)
竹井 力 (九大放射線科)

皮膚疾患に対する ³²P による β 線療法において、Applicator として汙紙を用いる代りに、寒天の薄膜を使用する当教室の方法は、竹井、計屋らが、すでに1959年に宮

崎での日本医学放射線学会第31回九州地方会で報告。その後1960年に Lahneche が、これに似たゼラチン法を発表している。

寒天法の利点は、1) つねに放射能の均等に分布した試料がえられる。2) 試料はうすくて、flexible であるため患部に密着させやすい。3) 透明なので、正確に、広すぎないように貼布できる。

われわれは最近40例の血管腫に ³²P を貼布した。海綿状血管腫18例中、著効5例、有効3例、不変10例。単純性血管腫22例中著効1例、有効4例、不変17例の治療成績をえた。

*

18 九大温研における RI 使用現況

八田 秋 川上弘泰
(九大温泉治療学研究所)

温研では密封線源として ⁶⁰Co を昭和34年より治療に使用し、非密封線源は RI 研究室のできた、昭和36年より使用されて、現在に至っている。

RI 使用室は研究用として、RI 研究室(17.15坪)、中性子発生装置室(22.26坪)、診療用としてセシウム2000C 照射室(20.0坪)、コバルト・ラジウム照射室(11.9坪)を有している。

医学研究としては、昭和36年より ³⁵S 単体、³⁵SO₄²⁻、⁶⁵Zn などによる経皮吸収、臓器沈着の ⁹⁰Sr と ⁹⁰Y の除去、¹⁴C 標識によるパントテン酸カルシウムの臓器分布、¹³¹I、⁶⁵Zn によるイオントホレーゼの組織浸透性などの研究がなされた。

理学研究としては、³⁵S、³⁶Cl、¹⁴C などによる温泉成分の同位体希釈分析、温泉水中の希土類元素の放射化分析、各種の RI トレーサーを利用する分析法の研究などを行なっている。

診療面では、密封線源として ¹³⁷Cs 2000C、⁶⁰Co、Ra による子宮頸癌、子宮体癌、腔癌外陰癌、などの治療、非密封線源として ¹⁹⁸Au、¹³¹I による肝血流量、循環血流量などの診断が行なわれている。

*

19. 九大放射線科における核医学研究の現状

入江英雄 前田辰夫 渡辺克司
鴛海良彦 中田 肇
(九大放射線科)

カラーテレビジョン(フライングスポットスキャナー、カラーコンバーター、カラモニター系統)による rescanning (Radioisotopes Vol, 14, No. 4, 1965) の紹介、