

221 ミオグロビン RIA キット (栄研) の基礎 のおよび臨床的検討

石井周一, 有田要一, 宮崎啓一 (札幌医大 R I センター), 鬼原 彰 (同第一内科)

第一反応および第二反応時間の検討の結果, 前者では 24 時間, 後者は 1 時間が適当と考えられた。標準曲線は $31.2 \sim 250 \text{ ng/ml}$ において直線性が得られた。再現性は測定系内で $4.3 \sim 9.6\%$, 測定系間では $10.8 \sim 12.9\%$ であった。回収率は $101.5 \sim 123.7\%$ であった。希釈試験では高濃度領域において, やや直線性に欠けたが, 低および中濃度領域では直線性が得られた。標識 ^{125}I -ミオグロビンの検定の結果, Whatman 3 MM 濾紙を用いた電気泳動では原点に 76% がとどまり 17% がヒト血清と共に移動した。また Sephadex G-100 カラムクロマトグラフィーでは 3 つのピークが認められ, 各々 5% , 67% , 27% を示した。今回はアルコール性心筋障害に関連して慢性アルコール症における血中ミオグロビンの測定を行った。その結果本症では健康対照群と比べて血中ミオグロビンは有意の上昇が認められた。以上栄研ミオグロビンキットの基礎的検討では臨床応用上ほぼ満足すべき結果が得られた。しかし ^{125}I -ミオグロビンの検定ではかなりの不均一性が認められた。臨床検討ではアルコール摂取が血中ミオグロビン上昇の促進作用を有することが示唆された。

222 No-Boil Radioassay Kit による血中 VB₁₂・葉酸同時測定法の基礎的検討

高原淑子, 石橋章彦, 佐藤仁政, 中村将孝, 与那原良夫 (国立東二・核) 細田佐喜雄 (国立久里浜)

核酸合成に際して補酵素的な役割を行う VB₁₂ や葉酸系の同時測定が必要な場合が少なくない。No-Boil Radioassay Kit による VB₁₂・葉酸測定 Kit はこの点を考慮して開発されたものである。今回この点にかなった No-Boil Radioassay Kit (コーニング) を使用する機会を得たので基礎的検討を加えた。

【結果】 1) 同時再現性は, 両者とも C.V. $2.84 \sim 5.25\%$ であった。2) 回収試験は, $91.0 \sim 108.9\%$ であった。3) 希釈試験は 0 濃度で行ったが良好な直線性を示した。4) 温度による測定値への影響についても検討を行った。温度の上昇と共に両者とも低値を示す傾向にあった。5) 溶血による測定値への影響は, VB₁₂ では変動はなかったが, 葉酸では溶血の上昇に伴い高値を示した。6) 血清と EDTA-2 Na 血漿とヘパリン血漿 3 者で測定を行った。VB₁₂・葉酸とも血漿値がやや高値になる傾向にあった。また赤血球内の VB₁₂・葉酸は, 血清中の値よりも, より変動が少なくと思われることから併せてこれらの検討も加えた。なお本検討に加えて, IF Blocking Antibody の検討も行った。

223 ジゴキシン迅速測定と薬物動態理論を用いた ジゴキシン投与設計とその臨床的意義の検討

柏田和子, 木田博和, 染谷一彦 (聖マ医大・三内) 増原慶壮, 篠崎公一, 荒井 栄 (同・薬剤部) 佐藤あけみ, 榊徳市 (同・放部核), 佐々木康人 (東邦大・放)

Phadebas Digoxin RIA キットを用い, 0 と 2.0 ng/ml のジゴキシンの含む標準血清で検量線を作成し, インキュベーション時間を短縮して迅速測定を行なった。迅速測定の結果は完全測定とよく一致した。臨床薬物動態理論を用いてジゴキシン投与開始後 3 ~ 6 日後の血中濃度より steady state の血中濃度を推定した。13 症例の予測値と実測値はよく一致し, その相関係数は 0.82 であった。

23 例の患者において血中濃度を測定し, 臨床薬物動態理論を用いて投与設計を行なった。患者は男性 9 名女性 14 名, 年齢は $42 \sim 91$ (平均 67.9) 才, 基礎疾患は心房細動 3 名, 弁膜症 6 名, 虚血性心疾患 5 名, 肺性心 4 名, 心筋症 3 名, その他 2 名である。ジゴキシンの投与量は $0.04 \sim 0.25 \text{ mg}$ で, 23 名中 12 名で投与設計による投与量の変更が行なわれた。Steady State に達した後, 臨床的に無効であったものは 2 例 (ジゴキシン血中濃度 $0.68, 1.27 \text{ ng/ml}$), 有効 18 例 ($0.48 \sim 2.37$, 平均 1.09 ng/ml), 中毒 3 例 ($1.62 \sim 3.08 \text{ ng/ml}$) であった。

224 血清微量物質の安定性の検討

その 1. 室温保存プル血清の安定期間について
宇佐美政栄 (岡山済生会総合病院, 核医検)

血清を保存する場合、保存方法により異なるのは当然であるが、酸化、水解、光分解等の化学変化や酵素の作用、また、温度による蛋白質の変性等のため血清成分の変化は避けられない。これらの影響を最小にするため、測定項目毎に保存方法と保存期間を知ることは重要である。このような目的のため、プル血清について 1) 室温保存, 2) 凍結融解のくりかえし, 3) 凍結保存 の 3 とおりの保存方法について血清成分の安定期間を 15 項目について検討した結果を報告する。

(結果) 1) 2 日 ~ 3 日で変性するもの、葉酸 2) 10 日以内で変性するもの、T₄, IRI, CPR, AFP 3) 20 日以内で変性するもの、TBG, TSH, BMG 4) 2 ヶ月程度で変性するもの、TaU 5) 2 ヶ月以上安定なもの、VB₁₂, CEA, IgE, エラスターゼ 1, フェリチン, 以上のように 2 ~ 3 日で変性するものから、2 ヶ月以上室温 ($23 \sim 29^\circ\text{C}$, 湿度 65% 以下) に放置され、腐敗しきった血清でも安定した測定値を得るものまであり、当初予想していたことが見事に裏切られた感じのする結果ではあるが、反面これだけ安定だから複雑な人体の調節に役立っているとも考えられる。なお凍結融解のくりかえし、凍結保存についての結果は、まだ出ていないので次の機会に報告したい。