

への集積が良好な 6 例中 4 例は MR 以上を示した。

まとめ 動注リザーバーより ^{99m}Tc -MAA を注入した肝への分布と治療効果は関連がみられ、これが不均等な場合はカテ位置の変更や血行変更術を行う必要があると思われた。

13. 糖尿病患者に対する血清ミオシン測定の実臨床的意義の検討

西巻 博 石井 勝巳 依田 一重
(北里大・放)

今回われわれは、糖尿病患者において血清中の心筋ミオシン軽鎖 I (以下、ミオシン) を測定し、潜在的な心筋障害の有無について検討した。本院内科外来を受診した糖尿病患者のうち無作為抽出された 53 例のうち、腎機能が正常の 42 例について、血清ミオシン値と血清 CPK 値、臨床経過を比較検討した。血清ミオシン値が高値を示していたのは、42 例中 7 例 (16.7%) であり、このうち血清 CPK 値の高値を認めたのは 2 例であった。臨床経過では 7 例中 2 例に虚血性心疾患の既往がみられた。

糖尿病患者について血清ミオシン値を測定することは臨床的に有意義であり、今後も経過観察して検討する必要があると思われた。

14. 下肢浮腫に対するリンパシンチグラムによる経過観察

鈴木 孝成 横内 順一 石井 巖
松田 裕道 黒田 真奈 井上 真吾
若林ゆかり 阿部 公彦 網野 三郎
(東京医大・放)
新井 久之 (東京医大・老)

リンパ浮腫に対するリンパシンチグラムはリンパ管造影と比較して、手技的に容易で、重篤な合併症を引き起こすこともなく、最近その重要性は増している。われわれは、複数回リンパシンチグラムを施行した 10 例について、治療前後の変化や経時的な変化について検討を加えた。

対象は、下肢浮腫のある 14-65 歳の男性 5 例、女性 5 例で、リンパ浮腫の成因としては、一次性 4 例、二次性 6 例であった。経過観察期間は、15 日から 4 年である。使用医薬品は、 ^{99m}Tc -rhenium colloid または ^{99m}Tc -

HSA である。

経時的な変化を比較した結果は、不変 3 例、悪化 5 例、改善 2 例であり、リンパ管の描出、鼠径リンパ節の描出、Dermal back flow などのリンパシンチグラム上の所見と、臨床症状はほぼ一致した。治療の指針として、リンパ浮腫の経過を観察するのに有用と考えられる。

15. 悪性膀胱褐色細胞腫の 1 治療例

町田 豊平 (慈恵医大・泌)
川上 憲司 森 豊 (同・放)

症例は 31 歳、男性。排尿痛と肉眼的血尿を主訴に 1988 年 8 月、当院入院。膀胱鏡検査で膀胱内に充実性の腫瘤を認め、生検にて組織学的に膀胱褐色細胞腫と診断された。既往に何度か排尿時失神を経験していた。内分泌学的検査で血中ノルアドレナリンの異常高値を示し、 ^{131}I -MIBG シンチグラフィで膀胱部にのみ異常集積像を認めた。1988 年 9 月、膀胱全摘、リンパ節郭清および尿路変更を行った。病理組織学的診断は、両側腸骨リンパ節転移を伴った膀胱褐色細胞腫であった。

^{131}I -MIBG シンチグラフィは、褐色細胞腫の局在診断に優れており、また治療への応用が期待される。

16. 前立腺癌マーカー PA, γSm , PAP 同時測定の実臨床的有用性

町田 豊平 上田 正山 木戸 晃
(慈恵医大・泌)

未治療前立腺癌 66 例、前立腺肥大症 130 例で PA, γSm , PAP を測定し、前立腺癌の腫瘍マーカーとしての臨床的有用性について検討した。未治療前立腺癌 66 例の血清 PA, γSm , PAP 値の陽性率はおよそ 77%, 83%, 57% で、 γSm が最も高かった。病期別陽性率は全 Stage で γSm の陽性率が高く、次いで PA であった。PAP 陽性で PA および γSm が陰性例の例は認めず、3 マーカーとも病期の進行に伴い高値を示す傾向が見られた。細胞分化度別の陽性率は 3 マーカーとも、高分化型と比較し、中、低分化型で陽性率が高い傾向が見られた。PA, γSm , PAP 同時測定で、3 マーカーとも陽性例は 37 例 53%, 2 マーカーでは 14 例 22%, 1 マーカーでは 5 例 8% であった。Sensitivity, Specificity, Efficiency はおよそ PA は 77%, 82%, 63%, γSm は 83%, 59%,